

(医師用)

<治癒証明書>

プチ・ふたば保育園 園長殿

入所児名 _____

病名「

令和 年 月 日 から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので
登園可能と判断します。

医療機関 _____

医師名 _____

印

※保育所は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場所です。感染症の集団発症や流行を
できるだけ防ぐことで、一人一人の子どもたちが一日快適に過ごせるよう配慮しております。
下記の感染症については治癒証明書の提出をお願いします。

子どもの健康状態が回復して、保育所生活が可能な状態となってから登園していただくよう
お願い致します。

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
インフルエンザ	症状がある期間（発症前24時間から発症後3日程度までが最も感染力が強い）	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで
水疱（みずぼうそう）	発疹出現1～2日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮化してから
麻疹（はしか）	発症1日前から発疹出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
風疹	発疹出現の7日前からその後7日間ぐらい	発疹が消失してから
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、類下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
咽頭結膜炎（プール熱）	発熱、充血等の症状が出現した数日間	主な症状が消えて2日経過してから
腸管出血性大腸菌感染（O157、O26、O111）		症状が始まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時間を空けて連続2回の検便によって菌陰性が確認されたもの
流行性角結膜炎	充血や目やに等の症状が出現した数日間	感染力が強いので結膜炎の症状が消失してから
急性出血性結膜炎	ウィルスが呼吸器から1～2週間、便から数週間～数か月間排出される	医師により感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認めるまで
結核		医師により感染の恐れがないと認めるまで

* コピーして繰り返しご利用ください